Médi-test

En collaboration avec l'Université Laval

Ce Médi-test a été élaboré avec la collaboration de l'Université Laval. Le questionnaire a été conçu et produit conformément aux principes de l'Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME).

Le fait de participer à ce Médi-test après avoir parcouru *Le Clinicien* est considéré comme une activité d'apprentissage autodirigé. Afin de recevoir une attestation de participation, encerclez vos réponses sur la feuille-réponses et expédiez cette dernière à STA HealthCare Communications afin de la faire certifier. Chaque questionnaire ne peut être soumis qu'une seule fois.

L'hypertrophie bénigne de la prostate, p. 59

1. Indiquez le traitement de premier choix pour l'hypertrophie bénigne de la prostate.

a) Certains médicaments, pris seuls
b) Un traitement médicamenteux combiné
c) La prostatectomie

2. Vrai ou faux? Il existe une corrélation entre le taux sérique d'antigène prostatique spécifique et le volume prostatique.

a) Vrai
b) Faux

Les atteintes oculaires : gardez l'œil ouvert!, p. 67

3. Vrai ou faux? Une diminution de la vision signifie nécessairement une atteinte oculaire.

a) Vrai
b) Faux

4. Quels sont les signes d'une congestion ciliaire?

a) Une rougeur qui atteint la conjonctive
b) Une conjonction des vaisseaux épiscléraux

Cette rubrique est rendue possible grâce à une subvention à la formation médicale continue de Merck Frosst Canada Ltée.

Médi-test

La surdité chez l'enfant : soyez à l'écoute, p. 71

5. Vrai ou faux? L'audition d'un enfant ne peut être évaluée qu'à partir de l'âge de 6 mois.

a) Vrai
b) Faux

6. Vrai ou faux? Un enfant atteint de surdité profonde peut apprendre à parler et à entendre correctement.

a) Vrai
b) Faux

La méningococcémie, p. 77

7. Les patients atteints de méningococcémie présentent quelles manifestations en phase initiale?

a) Des étourdissements et des pertes d'équilibre
b) Une tachycardie et des extrémités froides
c) De grosses plaques rouges partout sur le corps

8. Une méningite est associée à une septicémie dans quelle proportion des cas?

a) 5 %
b) 20 %
c) 40 %
d) 60 %

Voici les réponses du Médi-test du mois d'avril 2004 :

1. a
2. b
3. a
4. b
5. a
6. a
7. b
8. b

Inscrivez vos réponses sur la feuille ci-jointe et faites-nous-les parvenir avant le 15 novembre 2004.