Médi-test

En collaboration avec l'Université Laval

Ce Médi-test a été élaboré avec la collaboration de l'Université Laval. Le questionnaire a été conçu et produit conformément aux principes de l'Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME).

Le fait de participer à ce Médi-test après avoir parcouru *Le Clinicien* est considéré comme une activité d'apprentissage autodirigé. Afin de recevoir une attestation de participation, encerclez vos réponses sur la feuille-réponses et expédiez cette dernière à STA HealthCare Communications pour la faire certifier. Chaque questionnaire ne peut être soumis qu'une seule fois.

Vaincre la peur des autres : la phobie sociale, p. 63

1. Les personnes qui souffrent de phobie sociale redoutent les effets de l'alcool.

a) Vrai
b) Faux

2. Dans sa forme généralisée, la phobie sociale est une affection rare qui évolue spontanément vers une guérison sans séquelles.

a) Vrai
b) Faux

La démence : histoire d'une octogénaire, p. 71

3. Les inhibiteurs de la cholinestérase sont efficaces pour améliorer la mémoire.

a) Vrai
b) Faux

4. Indiquez à quels stades de l'échelle de Reisberg l'efficacité de la médication procholinergique est limitée?

a) Stades 6a et 6b
b) Stades 7a et 7b
c) Stades 8a et 8b

Cette rubrique est rendue possible grâce à une subvention à la formation médicale continue de Merck Frosst Canada Ltée.

Médi-test

La douleur thoracique atypique : l'évaluation est la clé, p. 77

5. Quels sont les deux symptômes cliniques qui peuvent aider à déterminer s'il s'agit ou non d'angine?

a) La douleur et son mode de présentation
b) La douleur et le sexe du patient
c) La douleur et l'âge du patient
d) La douleur et la nature des symptômes

6. Quelle est l'épreuve de provocation de l'ischémie la plus disponible?

a) L'échocardiographie cardiaque du stress d'effort ou pharmacologique
b) La scintigraphie myocardique d'effort ou pharmacologique
c) L'épreuve d'effort

Les troubles anxieux : comment les surpasser? p. 85

7. Quel est le pourcentage des personnes qui seront atteintes de troubles anxieux au cours de leur vie?

a) 15 %
b) 25 %
c) 35 %

8. Lors du traitement des troubles anxieux, les problèmes de dépendance sont toujours à craindre.

a) Vrai
b) Faux

Voici les réponses du Médi-test du mois de février 2004 :

1. a
2. c
3. c
4. f
5. c
6. c
7. a
8. a

Inscrivez vos réponses sur la feuille ci-jointe et faites-nous-les parvenir avant le 15 septembre 2004.