Médi-test

En collaboration avec l'Université Laval

Ce Médi-test a été élaboré avec la collaboration de l'Université Laval. Le questionnaire a été conçu et produit conformément aux principes de l'Accreditation Council for Medical Education (ACCME).

Le fait de participer à ce Médi-test après avoir parcouru *Le Clinicien* est considéré comme une activité d'apprentissage autodirigé. Afin de recevoir une attestation de participation, encerclez vos réponses sur la feuille-réponse et expédiez cette dernière à STA HealthCare Communications pour la faire certifier. Chaque questionnaire ne peut être soumis qu'une seule fois.

Le syndrome coronarien aigu, p. 79

1. Vrai ou faux? Une classification précoce des patients atteints de syndrome coronarien aigu est essentielle, car elle permet, entre autres, de prédire le risque d'événements cardiaques futurs.

a) Vrai
b) Faux

2. Les patients à haut risque d'évoluer vers un syndrome coronarien aigu sont âgés de :

a) Plus de 55 ans
b) Plus de 65 ans
c) Plus de 75 ans
d) Plus de 85 ans

L'hyperthyroïdie, p. 87

3. Une fois que l'on a identifié une hyperthyroïdie (clinique et/ou biologique), quel est le prochain test à effectuer pour orienter vers une cause?

a) Dosage de thyroglobuline
b) Vitesse de sédimentation
c) Scintigraphie/captation
d) Dosage IL-6

4. Quelles sont les approches thérapeutiques de l'hyperthyroïdie de Graves?

a) Bêtabloqueurs
b) Antithyroïdiens de synthèse
c) Iode-131
d) Chirurgie
e) Glucocorticoïdes
f) Tous ces traitements

Cette rubrique est rendue possible grâce à une subvention à la formation médicale continue de Merck Frosst Canada Ltée.

La dyspnée : est-ce de l'asthme? p. 96

5. Parmi les événements suivants, lequel n'est pas une cause physiologique de dyspnée?

a) L'asthme
b) La fibrose pulmonaire
c) La rhinite
d) L'anémie
e) L'insuffisance cardiaque

6. Lequel des énoncés suivants est faux?

a) Les corticostéroïdes inhalés représentent le traitement de première ligne lorsque l'asthme n'est pas maîtrisé.
b) Les agonistes des récepteurs B_2 à courte durée d'action peuvent être employés au besoin, sans thérapie anti-inflammatoire, pour le traitement de l'asthme.
c) Les agonistes des récepteurs B_2 à longue durée d'action peuvent être employés sans thérapie anti-inflammatoire pour le traitement de l'asthme.
d) Un plan d'action consiste généralement à doubler ou à quadrupler les corticostéroïdes inhalés lors d'une exacerbation de l'asthme.
e) Un plan d'action écrit est préférable à un plan d'action verbal.

L'infection à *C. difficile*, p. 101

7. Vrai ou faux? Tous les antibiotiques peuvent prédisposer à une infection par le *C. difficile*.

a) Vrai
b) Faux

8. Vrai ou faux? La colite fulminante survient chez 2 à 3 % des patients infectés par le *C. difficile*.

a) Vrai
b) Faux

Réponses au Médi-test du mois d'octobre 2003

1. e
2. c
3. a
4. b
5. b
6. c
7. b
8. d
9. a
10. a

Inscrivez vos réponses sur la feuille ci-jointe et faites-nous-les parvenir avant le 15 mai 2004.