

# Médi-test



## En collaboration avec l'Université Laval

Le Centre de formation continue de la Faculté de médecine de l'Université Laval attribuera une heure de crédit de catégorie 2 aux médecins qui rempliront ce questionnaire de façon adéquate.

Pour les spécialistes qui participent au Programme de maintien de la compétence du Collège Royal, cette activité s'inscrit dans la catégorie 2 des activités du service d'Éducation médicale continue.

---

### La diarrhée chronique, p. 71

---

1. Toutes les étapes suivantes font partie de l'évaluation initiale d'un patient âgé de 32 ans qui se plaint de diarrhée chronique, sauf une. Laquelle?
  - a) Anamnèse détaillée
  - b) Examen physique complet
  - c) Bilan sanguin de base
  - d) Recherche de parasites dans les selles
  - e) Coloscopie complète
2. Les symptômes suivants doivent éveiller des soupçons d'une cause organique à la diarrhée chronique, sauf un. Lequel?
  - a) Présence de sang dans les selles
  - b) Diarrhée qui réveille le patient la nuit
  - c) Crampes abdominales reliées aux diarrhées
  - d) Perte de poids inexplicée
  - e) Anémie

---

### L'urticaire, p. 81

---

3. L'urticaire physique survient surtout chez les personnes appartenant à quel groupe d'âge?
  - a) 17 à 40 ans
  - b) 41 à 64 ans
  - c) 65 ans et plus
4. Vrai ou faux? Les traitements de deuxième ligne s'adressent à tous les patients qui souffrent d'urticaire.
  - a) Vrai
  - b) Faux

---

Cette rubrique est rendue possible grâce à une subvention à la formation médicale continue de Merck Frosst Canada Ltée.

# Médi-test

---

## Les antidiabétiques, p. 93

---

5. Vrai ou faux? Le gliclazide est l'agent de premier choix pour tous les patients diabétiques de type 2.

- a) Vrai
- b) Faux

6. Quelle est la sulfonylurée la plus utilisée?

- a) Le gliclazide
- b) La répaglinide
- c) Le glyburide

---

## La désensibilisation, p. 105

---

7. Madame Dubois arrive sans rendez-vous pour recevoir son vaccin. Elle reçoit son vaccin chaque mois et elle est en entretien. Octobre tire à sa fin et elle n'a pas eu beaucoup de symptômes d'allergie durant la saison d'allergies. Il y a un mois, elle a reçu 0,15 mL de la bouteille de vaccin numéro 4 et la réaction locale a été de 2 cm. Son vaccin contient 40 % d'allergène de bouleau, 20 % de graminées et 40 % d'herbe à poux. Quelle dose lui administrez-vous?

- a) 0,10 mL de la bouteille numéro 4
- b) La même dose (0,15 mL de la bouteille numéro 4)
- c) La dose suivante (0,2 mL de la bouteille numéro 4)
- d) Aucune de ces réponses

8. Johanne reçoit un vaccin contre les allergies à votre clinique depuis bientôt un an. Il contient 50 % d'allergène de bouleau et 50 % d'allergène de graminées. Nous sommes le 15 septembre et sa dernière injection a été effectuée le 15 juillet. Elle a alors reçu 0,40 mL de la bouteille de vaccin numéro 4. Elle reçoit son vaccin tous les mois depuis le printemps dernier. Elle n'a pu venir en août, car elle était en vacances à l'étranger. Que faites-vous?

- a) Vous lui administrez la même dose de vaccin que les mois précédents.
- b) Vous augmentez la dose à 0,50 mL de la bouteille numéro 4, puisque sa saison d'allergies est terminée.
- c) Vous diminuez sa dose à 0,20 mL de la bouteille de vaccin numéro 4 et lui demandez de revenir dans un mois pour lui administrer 0,40 mL de la bouteille numéro 4.
- d) Vous diminuez sa dose à 0,20 mL de la bouteille numéro 4 et lui demandez de revenir dans une semaine pour augmenter sa dose chaque semaine jusqu'à 0,40 mL, puis vous continuez chaque mois.

---

## Le syndrome du côlon irritable, p. 117

---

9. Vrai ou faux? Le syndrome du côlon irritable est la maladie gastro-intestinale la plus souvent diagnostiquée.

- a) Vrai
- b) Faux

10. Vrai ou faux? Un examen endoscopique, tel qu'une endoscopie longue, est recommandé chez tous les patients âgés de plus de 50 ans.

- a) Vrai
- b) Faux

Inscrivez vos réponses sur la feuille ci-jointe et faites-nous-les parvenir avant le 15 janvier 2003.